

TECHNIQUE



PREMIÈRE UTILISATION

S'il s'agit d'un nouvel appareil, vous devez le préparer avant la première utilisation, en plaçant la cartouche dans le Novolizer®.



1 Tenez le **Novolizer®** horizontalement.



2 Au-dessus du **Novolizer®** se trouve un couvercle. Appuyez légèrement sur les surfaces nervurées et poussez celui-ci vers l'avant et soulevez le.



3 Retirez le film protecteur en aluminium du **boîtier de la cartouche**.



4 Prenez la cartouche et notez la date d'ouverture sur la cartouche neuve.




5 Placez la cartouche dans l'inhalateur (en orientant le compteur de doses face à l'embout buccal).

6 Remettez le couvercle sur les coulisses (↓) et repoussez-le vers le bouton coloré jusqu'à ce qu'un claquement indique qu'il est en place. Le **Novolizer®** est prêt à l'emploi.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Par soucis de durée de conservation la cartouche doit être uniquement sortie de son emballage juste avant la première utilisation.
- ✓ La cartouche peut être utilisée maximum pendant 6 mois après son insertion.





- 1 Tenez-vous droit.
- 2 Retirez le bouchon protecteur de l'embout buccal en appuyant sur les deux côtés des zones rainurées.
- 3 Tenez le **Novolizer**[®] horizontalement. Appuyez à **fond** sur le bouton coloré. On perçoit alors un double déclic sonore et la couleur de la fenêtre de contrôle passe **du rouge au vert**. Le **Novolizer**[®] est prêt à l'emploi.
- 4 Gardez le **Novolizer**[®] horizontalement.
- 5 Expirez à fond (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).
- 6 Placez l'embout buccal dans la bouche et refermez bien les lèvres autour de l'embout.
- 7 Penchez légèrement la tête vers l'arrière.
- 8 Inspirez **vite et profondément**, vous entendez un "clic" indiquant que la dose est libérée. Continuez à respirer normalement. **Lors d'une bonne inhalation la couleur de la fenêtre de contrôle passe du vert au rouge**. Inspirez à nouveau vite et profondément si la fenêtre de contrôle était restée au vert.
- 9 Retenez votre respiration 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que possible) et **retirez l'inhalateur hors de la bouche**.
- 10 Expirez lentement par la bouche (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).
- 11 Si vous devez prendre plusieurs doses recommencer les étapes 3 à 10 inclus.
- 12 Replacez le capuchon protecteur sur l'embout buccal.
- 13 Rincez-vous la bouche avec de l'eau (**ne pas avaler**).

RECOMMANDATIONS

- ✓ Jetez le **Novolizer**[®] quand la cartouche est vide. Dans chaque nouvel emballage vous trouverez un nouveau **Novolizer**[®].
- ✓ Conservez l'inhalateur dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- ✓ Ne jamais expirer dans le **Novolizer**[®].
- ✓ Le **Novolizer**[®] est vide quand le compteur de doses est sur zéro. Contrôler à temps.

